

Dextrose 50%

Injection Stérile

Contre les carences de glucose

DIN 00467618



INDICATIONS

Comme adjuvant au traitement des carences en glucose chez les bovins, chevaux, moutons et porcs. Egalement comme aide à l'acetonémie des bovins et maladie de la gestation chez les moutons.

DESCRIPTION

Traitement de dextrose pour les bovins, les chevaux, les moutons et les porcs.

EMBALLAGE

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
1DEX020	500 mL	12

Voir le cote contraire pour l'Administration et le posologie.

Dextrose 50%

Injection Stérile

Contre les carences de glucose

DIN 00467618

Usage Vétérinaire Seulement

INGRÉDIENTS ACTIF:

Monohydrate de dextrose 50% p/v
(équivalent à 500 mg par mL)

INDICATIONS:

Comme adjuvant au traitement des carences en glucose chez les bovins, chevaux, moutons et porcs. Egalement comme aide à l'acetonémie des bovins et maladie de la gestation chez les moutons.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

Réchauffer à la température du corps avant administration. Administration par injection intraveineuse ou intrapéritonéale chez les bovins, moutons et porcs et **PAR INJECTION INTRAVEINEUSE SEULEMENT CHEZ LES CHEVAUX.**

Bovins et chevaux adultes: 250 à 500 mL

Moutons et porcs adultes: 50 à 150 mL

Peut être répétée après quelques heures, au besoin.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas conserver les flacons entamés. Ne contient aucun agent de conservation. Si aucune amélioration dans l'état de l'animal n'est observée dans les 2 à 3 jours ou moins, selon la gravité de l'état, il est recommandé de reconfirmer le diagnostic et de consulter un vétérinaire.

MISE EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE: Garder au frais à l'abri de la lumière.
PRÉSERVER DU GEL.

1DEX020/8DEX012

8DEX012 Dextrose_Tech_03/11